

ФИО пациента: ТЕСТ АНОНИМ АНОНИМ

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 04/06/1998

Полных лет: 27

Референсная группа:

Заказчик: ОБРАЗЕЦ



№ заказа: ОБРАЗЕЦ

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
<b>АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (группа №2)</b>			
<b>Биоматериал:</b> Сыворотка крови	<b>Дата взятия биоматериала:</b> 04/06/2025 08:25	<b>Дата поступления в лабораторию:</b> 05/06/2025	
<i>A12.06.036.000.01 Определение содержания антител к микросомам печени и почек (LKM-1) в крови</i>			
Антитела к микросомам печени и почек (LKM-1)	<1:40	Титр	<1:40
<p>Отрицательный результат определения содержания аутоантител к микросомам печени-почки (liver-kidney microsomal autoantibodies, LKM) позволяет с вероятностью 90-95% исключить диагноз аутоиммунного гепатита 2 типа, который преобладает у детей и подростков. В 10% случаев аутоиммунный гепатит 2 типа может изолированно сопровождаться обнаружением антител к цитозольному антигену печени типа 1 (LC-1), которые могут быть исследованы с помощью иммуноблота антител при аутоиммунных заболеваниях печени. Антитела к микросомам печени-почек направлены против ферментов перекисного окисления липидов (цитохрома P450 2D6 (CYP 2B6) и 2C9 (CYP 2C9)) и различных изоформ уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы (UGT). Отрицательный результат теста не исключает наличия аутоиммунного гепатита, первичного билиарного холангита и первичного склерозирующего холангита, что требует проведения комбинированного обследования.</p>			

Исполнители: Образец О.Б.

Подпись исполнителя:

Дата выдачи результата: 05/06/2025

Печать организации