место под штрих-код

# ГАСТРОПАНЕЛЬ

8-800-100-36-30
www.citilab.ru
ситилаб

Выбранные исследования помечаются только крестиком ☒. Полностью заштрихованный квадрат ▥ означает отмену исследования. Поля заполняются ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ черной шариковой ручкой.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Фамилия:** | ФАМИЛИЯ ПАЦИЕНТА | **Дата взятия пробы:** | Д Д . М М . Г Г |
| **Имя:** | ИМЯ | **Время взятия пробы:** | Ч Ч : М М |
| **Отчество:** | ОТЧЕСТВО ПАЦИЕНТА | **Код ЛПУ:** / **Код подр.:** | |
| **Дата рождения:** | Д Д . М М . Г Г Г Г | **пол:** М. ☐ Ж. ☐ | **Пробу взял:** ФАМИЛИЯ |
| **Срок берем. (нед.):** | | **День цикла:** / **Менопауза:** / **Отсутствие цикла/аменорея:** | **Врач:** ФАМИЛИЯ |
| **Диагноз** | | | |
| **Принимаемые препараты** | | | |
| **Тел./моб.** | | **e-mail:** | |

Комплекс тестов (разработка финской компании BIOHIT), позволяющих выявить наличие Helicobacter pylori- ассоциированного гастрита, определить локализацию патологического процесса в желудке и оценить характер изменений. Программная обработкаданных (GastroSoft, BIOHIT) позволяет предоставить наиболее вероятную интерпретацию результатов, предполагаемый диагноз, расчёт рисков и рекомендации.

**Заполняется со слов пациента (выбрать нужный вариант)**

1. Эрадикация H. pylori — стандартное лечение, направленное на полное уничтожение H. pylori с использованием антибиотиков и др.):

☐ > 1 года назад ☐ < 1 года назад ☐ не было ☐ неизвестно

2. Использование препаратов ИПП (ингибиторы протонной помпы, например, лансопразол, омепразол, пантопразол, эзомепразол, рабепразол и др.):

☐ часто ☐ иногда ☐ нет ☐ неизвестно

3. Симптомы повышенной кислотности (кислый привкус во рту, отрыжка, изжога, несварение желудка):

☐ часто ☐ нет ☐ неизвестно

4. Использование НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, например, аспирин, ибупрофен, диклофенак, индометацин и др.):

☐ часто ☐ нет ☐ неизвестно

| | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 99-20-303 | **Гастропанель** (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | кровь ЭДТА, аликвота -20 *! (натощак – 1 шт.) |
| ☐ | 99-20-304 | **Гастропанель расширенная** (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | кровь ЭДТА, аликвота -20 *! (после нагрузки – 1 шт.) кровь ЭДТА, аликвота -20 *! (натощак – 1 шт.) |

* Стимуляционная проба позволяет дифференцировать пациентов с атрофическим гастритом антрального отдела от пациентов с низким базальным уровнем гастрина-17 (<1 пмоль/л натощак), связанным с высокой кислотностью.

Аллергических реакций на сою, молочные продукты, яйца, шоколад не наблюдалось (эти компоненты могут входить в состав белкового напитка, применяющегося для стимуляционной пробы).

Настоящим подтверждаю, что с правилами преаналитики перед проведением теста ознакомлен(а), мне разъяснено, что несоблюдение указанных правил может повлиять на результаты исследования.

ФИО _____ / _____ « _____ » _____ 20 _____ г.
подпись дата