

место под штрих-код

ГАСТРОПАНЕЛЬ

Выбранные исследования помечаются только крестиком . Полностью заштрихованный квадрат означает отмену исследования. Поля заполняются ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ черной шариковой ручкой.

Фамилия:	Ф	А	М	И	Л	И	Я	П	А	Ц	И	Е	Н	Т	А	Дата взятия пробы:	Д	Д	.	М	М	.	Г	Г		
Имя:	И	М	Я	П	А	Ц	И	Е	Н	Т	А	Время взятия пробы:	Ч	Ч	:	М	М									
Отчество:	О	Т	Ч	Е	С	Т	В	О	П	А	Ц	И	Е	Н	Т	А	Код ЛПУ:					Код подр.:				
Дата рождения:	Д	Д	.	М	М	.	Г	Г	Г	Г	пол:	М.	М	Ж.	Ж	Пробу взял:	Ф	А	М	И	Л	И	Я			
Срок берем. (нед.):			День цикла:			Мено- пауза:			Отсутствие цикла/ аменорея:			Врач:	Ф	А	М	И	Л	И	Я							
Диагноз																										
Принимаемые препараты																										
Тел./моб.											e-mail:															

Комплекс тестов (разработка финской компании BIONIT), позволяющих выявить наличие Helicobacter pylori- ассоциированного гастрита, определить локализацию патологического процесса в желудке и оценить характер изменений. Программная обработка данных (GastroSoft, BIONIT) позволяет предоставить наиболее вероятную интерпретацию результатов, предполагаемый диагноз, расчёт рисков и рекомендации.

Заполняется со слов пациента (выбрать нужный вариант)

1. Эрадикация H. pylori — стандартное лечение, направленное на полное уничтожение H. pylori с использованием антибиотиков и др.):

> 1 года назад < 1 года назад не было неизвестно

2. Использование препаратов ИПП (ингибиторы протонной помпы, например, лансопризол, омепразол, пантопризол, эзомепразол, рабепразол и др.):

часто иногда нет неизвестно

3. Симптомы повышенной кислотности (кислый привкус во рту, отрыжка, изжога, несварение желудка):

часто нет неизвестно

4. Использование НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, например, аспирин, ибупрофен, диклофенак, индометацин и др.):

часто нет неизвестно

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	
<input type="checkbox"/> 99-20-303	Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение	кровь ЭДТА -20 *! (натошак – 1 шт.)
<input type="checkbox"/> 99-20-304	Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение	кровь ЭДТА, аликвота -20 *! (после нагрузки – 1 шт.) кровь ЭДТА, аликвота -20 *! (натошак – 1 шт.)

* Стимуляционная проба позволяет дифференцировать пациентов с атрофическим гастритом антрального отдела от пациентов с низким базальным уровнем гастрин-17 (<1 пмоль/л натошак), связанным с высокой кислотностью.

Аллергических реакций на сою, молочные продукты, яйца, шоколад не наблюдалось (эти компоненты могут входить в состав белкового напитка, применяющегося для стимуляционной пробы).

Настоящим подтверждаю, что с правилами преаналитики перед проведением теста ознакомлен(а), мне разъяснено, что несоблюдение указанных правил может повлиять на результаты исследования.

ФИО _____ / _____
подпись

« _____ » _____ 20 _____ г.
дата